

第2類医薬品

レーバンG ローション

〈痔疾用外用薬〉



500mL

第2類医薬品

レーバンGローション

ローションタイプ

〔成分・分量〕 100mL中

ベンザルコニウム塩化物…………… 0.05 g
 プロカイン塩酸塩…………… 0.1 g
 ナファゾリン塩酸塩…………… 0.05 g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩
 …………… 0.05 g
 ベンジルアルコール…………… 0.5 g
 添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、ハッカ油、プロピレングリコール、香料を含有します。

〔効能・効果〕

肛門部・外陰部のそう痒症・肛門周囲炎・いぼ痔・きれ痔・脱肛・肛門の裂創

〔用法・用量〕



脱脂綿またはガーゼに本液を浸して、1日数回患部を清拭するか、またはあん法してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

肛門部及び外陰部にのみ使用してください。

使用期限

製造番号

発売元
 日邦薬品工業株式会社
 東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuin.jp/>
 製造販売元
 万協製薬株式会社
 三重県多気郡多気町五桂1169-142

第2類医薬品

レーバンG ローション

〈痔疾用外用薬〉



500mL

⚠〔使用上の注意〕

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| そ の 他 | 刺激感 |
- 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

📦〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

万協製薬株式会社「お客様相談室」
 電話 0598-30-5376
 受付時間 10:00～17:00 (ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

