

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ナイフル
2	成分・分量	[2錠中] ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg
3	用法・用量	寝つきが悪い時や眠りが浅い時、次の1回量を1日1回、就寝前に服用してください。 大人(15歳以上):2錠、15歳未満:服用しないこと
4	効能・効果	一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください。 (1)妊婦又は妊娠していると思われる人 (2)15歳未満の小児 (3)日常的に不眠の人 (4)不眠症の診断を受けた人 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 (眠気をもよおして事故を起こすことがあります。また、本剤の服用により、翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合は、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 服用前後は飲酒しないでください。 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、長期連用はしないでください。 <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人 ・高齢者(鎮静作用ではなく興奮作用が見られることがある) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 次の症状のある人:排尿困難 次の診断を受けた人:緑内障、前立腺肥大
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。