

薬局

飲み薬が（ ）日間出ています。	kǒu fú yào kāi le (sān) tiān 口 服 药 开 了 (三) 天 的。
カプセルと錠剤と粉薬です。	jiāo náng , yào piàn hé yào miàn 胶 囊 , 药 片 和 药 面 儿。
他に薬を飲んでいませんか？	xiàn zài zài fú yòng bié de yào ma? 现 在 在 服 用 别 的 药 吗？
お薬手帳は持っていますか。	nǐ yǒu fú yào shǒu cè ma? 你 有 服 药 手 册 吗？
痛みがあるときに飲んで下さい。	téng de shí hou , qǐng fú yòng 疼 的 时 候 , 请 服 用 。
痒みがあるときに塗ってください。	yǎng de shí hou , qǐng tú yào 痒 的 时 候 , 请 涂 药 。
眠れないときに飲んでください。	shuì bù zháo de shí hou qǐng fú yòng 睡 不 着 的 时 候 , 请 (請) 服 用 。
熱が 38℃以上あるときに飲んでください。	fā shāo guò (guò) sān shí bā dù de shí hou , 发 烧 , 过 (過) 三 十 八 度 , 的 时 候 , qǐng fú yòng 请 服 用 。
これは胃薬です。他の薬が胃に負担がかかるので一緒に飲んでください。	zhè shì hù wèi yào 这 是 护 (護) 胃 药 。
	yīn wéi kāi de yào duì wèi yǒu fù zuò yòng 因 为 开 (開) 的 药 , 对 胃 有 副 作 用 , suǒ yǐ qǐng yì qǐ fú yòng 所 以 请 一 起 服 用 。
これは軟膏です。痒みのある部分に塗って下さい	zhè shì ruǎn gāo 这 是 软 (軟) 膏 , qǐng tú yǎng de huàn bù 请 涂 痒 的 患 部 。
これは軟膏です。痛みのある部分に塗って下さい	zhè shì ruǎn gāo 这 是 软 膏 。
	qǐng tú téng de huàn bù 请 涂 疼 的 患 部 。
薬は冷蔵庫に入れて保管してください。	qǐng bǎ yào fàng zài bīng xiāng lǐ bǎo guǎn 你 请 把 药 , 放 , 在 冰 箱 里 , 保 管 。
() 日分のお薬が出ています。	kāi kāi le (yī) tiān de yào 开 (開) 了 (一) 天 的 药 。

薬局

<p>温かいお湯で溶かしてから飲んでください。</p>	<p>yòng wēn kāi shuǐ róng huà hòu fú yòng 用 温 开 水 溶 化 后 (後) 服 用 。</p>
<p>これは原液です。()倍のお水で薄めて飲んでください。</p>	<p>zhè shì yuán yè yòng bèi de shuǐ xī 这 是 原 液 。 用 (2 liang3) 倍 的 水 , 稀 shì hòu fú yòng 释 后 , 服 用 。</p>
<p>便の色が変わるかもしれませんが心配しないでください。</p>	<p>kě néng dà biàn de yán sè yǒu biàn huà 可 能 , 大 便 的 , 颜 色 , 有 变 化 , qǐng bú yòng dān xīn 请 不 用 , 担 心 。</p>
<p>1日3回食事の前に飲んでください。</p>	<p>qǐng yì tiān sān cì zài fàn qián fú yòng 请 一 天 三 次 , 在 饭 前 , 服 用 。</p>
<p>1日3回食事の後に飲んでください。</p>	<p>qǐng yì tiān sān cì zài fàn hòu fú yòng 请 一 天 , 三 次 , 在 饭 后 服 用 。</p>
<p>食間のお薬です。()時頃飲んでください</p>	<p>liǎng dùn fàn de zhōng jiān de yào 两 顿 饭 的 , 中 间 的 药 。 qǐng zài diǎn zuǒ yòu fú yòng 请 在 , (2 liang3) 点 左 右 服 用 。</p>
<p>朝食と夕食の後に()錠ずつ飲んでください。</p>	<p>qǐng zǎo hé wǎn fàn hòu fú piàn 请 早 饭 和 晚 饭 后 , 服 (2liang3) 片 。</p>
<p>()時間おきに()錠飲んでください。</p>	<p>qǐng měi gé xiǎo shí fú piàn 请 每 隔 (2) 小 时 , 服 (2 liang3) 片 ,</p>
<p>これはシップです。痛みのある部分に張ってください。</p>	<p>zhè shì shī bù qǐng tiē téng de huàn bù 这 是 湿 布 。 请 贴 , 疼 的 患 部 。</p>
<p>これはうがい薬です。()滴たらしめて水で薄めて下さい。</p>	<p>zhè shì shù kǒu yào 这 是 , 漱 口 药 。 dī dī hòu yòng shuǐ xī shì 滴 (2liang3) 滴 后 , 用 水 稀 释 。</p>
<p>これは点眼薬です。1日()回、目にさしてください</p>	<p>zhè shì yǎn yào yī tiān shàng cì 这 是 眼 药 。 一 天 上 (2liang3) 次 。</p>
<p>これは点耳薬です。1日()回耳にさしてください。</p>	<p>zhè shì diǎn ěr yào yì tiān diǎn cì 这 是 点 耳 药 。 一 天 点 (liang3) 次 。</p>
<p>これは便秘のお薬です。毎日食後に</p>	<p>zhè shì biàn mì yào qǐng měi tiān fàn hòu fú yòng 这 是 便 秘 药 。 请 每 天 饭 后 服 用 。</p>

薬局

飲んでください。	
これは座薬です。肛門に入れてください。	zhè shì zuò yào qǐng fàng rù gāng mén lǐ 这是坐药。请放入肛门里。
尿の色が変わるかもしれませんが心配いりません。	kě néng niào de yán sè yǒu biàn huà 可能尿的颜色有变化， qǐng bú yòng dān xīn 请不要担心。
眠くなるので車の運転や危ない作業などはやめてください。	yīn wéi huì fā kùn suǒ yǐ qǐng bié kāi chē huò zuò 因为会发困，所以请别开车或做 wēi xiǎn de gōng zuò 危险的工作。
保険証を出してください	qǐng chū shì bǎo xiǎn zhèng 请出示保险证。
当院は院外処方箋を発行しております。	běn yuàn chū yuàn wài yào fāng 本院出院外药方。
この処方箋を調剤薬局まで持って行ってください。	qǐng bǎ zhè ge yào fāng ná qù yào diàn 请把这个药方拿去药店。
処方箋をファックスしておきますね。	nà shì xiān bǎ yào fāng yòng chuán zhēn fā le ba 那事先把药方用传真发了吧。
お大事にしてください	qǐng duō bǎo zhòng 请多保重。
更なるフレーズは随時追加します。	

